



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

GoRAIN για άμεση ανακούφιση από τον πόνο

03 Νοεμβρίου 2021. Ένα νέο καινοτόμο προϊόν κυκλοφόρησε πρόσφατα η ELPEN για την ανακούφιση από καθημερινούς πόνους, όπως είναι ο πονοκέφαλος, οι μυοσκελετικοί πόνοι και οι πόνοι περιόδου. Πρόκειται για το GoRAIN, ένα νέο αναλγητικό και αντιφλεγμονώδες σκεύασμα, το οποίο περιέχει το μοναδικό συνδυασμό δυο καταξιωμένων δραστικών ουσιών, της παρακεταμόλης και της ιβουπροφαίνης σε ένα μόνο δισκίο. Η χρήση του ενδείκνυται για βραχυπρόθεσμη συμπτωματική θεραπεία του ήπιου έως μέτριου πόνου με τη δράση του να ξεκινά από τα πρώτα 10 λεπτά.

Ο πόνος αποτελεί μια ιδιαίτερα συχνή εμπειρία, που επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ατόμου και την αποδοτικότητά του στην εργασία¹. Μπορεί να εμφανιστεί με διαφορετική ένταση, να ποικίλει σε διάρκεια και να οφείλεται σε διάφορα παθοφυσιολογικά αίτια³. Η γρήγορη ανακούφιση αποτελεί το πρωταρχικό ζητούμενο των ανθρώπων που βιώνουν συνθήκες πόνου¹.

Οι οξείες επώδυνες καταστάσεις, όπως είναι η κεφαλαλγία τάσης, η ημικρανία και ο οξύς πόνος στη μέση συγκαταλέγονται στις 10 πιο συχνές επώδυνες καταστάσεις παγκοσμίως. Επιπλέον, οι πιο κοινές χρόνιες επώδυνες καταστάσεις θεωρούνται ο πόνος στη μέση, ο πόνος στον αυχένα, ο πόνος της οστεοαρθρίτιδας και άλλων μυοσκελετικών παθήσεων².

Η βασικότερη κατηγοριοποίηση του πόνου είναι σε οξύ και χρόνια, ανάλογα με την αιτιολογία και την παθοφυσιολογία που τον προκαλεί. Ο οξύς πόνος αποτελεί από μόνος του μια προστατευτική λειτουργία του οργανισμού⁴, καθώς προειδοποιεί για κάποια νόσο ή τραυματισμό που εξελίσσεται. Ο χρόνιος πόνος είναι ο πόνος που διαρκεί περισσότερο από τον συνήθη χρόνο επούλωσης των ιστών του σώματος. Συχνά περιγράφεται ως ο πόνος που διαρκεί τουλάχιστον τρεις μήνες. Ο χρόνιος πόνος μπορεί να συνοδεύεται από κόπωση, άγχος και κατάθλιψη, παράγοντες που οδηγούν σε κακή ποιότητα ζωής.⁵

Σε ένα μόνο δισκίο το GoRAIN προσφέρει τη διπλή δράση των καταξιωμένων φαρμάκων παρακεταμόλη και ιβουπροφαίνη στις ελάχιστες συγκεντρώσεις του συγκεκριμένου συνδυασμού. Με δράση που

ξεκινάει από τα πρώτα 10 λεπτά , συμβάλλει αποδεδειγμένα στην άμεση ανακούφιση από τον πόνο, χωρίς να επιβαρύνει τον οργανισμό με μεγάλες δόσεις φαρμάκων. Περιέχοντας 500 mg παρακεταμόλης και 150 mg ιβουπροφαίνης ανά δισκίο, το Gorain προσφέρει ευελιξία στη δοσολογία, ανάλογα με την ένταση του πόνου. Ταυτόχρονα, η λήψη δύο ουσιών σε ένα μόνο δισκίο εξασφαλίζει ευκολία στη χρήση, καλύτερη συμμόρφωση και μείωση της πιθανότητας υπέρ- ή υπο- δοσολόγησης.

Η χορήγησή του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα έξι δισκία ημερησίως και μπορεί να γίνει με τη μορφή ενός ή δύο δισκίων ανά έξι ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν για αναλγησία.

Η ELPEN δραστηριοποιείται εδώ και 56 χρόνια στην ανάπτυξη και παραγωγή επώνυμων ελληνικών φαρμάκων υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Με την κυκλοφορία του Gorain, διευρύνει ακόμα περισσότερο το χαρτοφυλάκιο των σκευασμάτων της, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική προσήλωσή της στην έρευνα νέων σκευασμάτων που βελτιώνουν την υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Αναφορές

1,2. Derry S. et. al, Topical analgesics for acute and chronic pain in adults - an overview of Cochrane Reviews (Review), Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017, Issue 5. Art. No.: CD008609

3. Srinivasa N. Raja et. al., The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. Pain. 2020 Sep 1;161(9):1976-1982. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001939. PMID: 32694387; PMCID: PMC7680716.

4. Paulina Swieboda et al. , Assessment of pain: types, mechanism and treatment, Ann Agric Environ Med. 2013; Spec no. 1:2-7

5. Geneen LJ, Moore RA et al., Physical activity and exercise for chronic pain in adults: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 24;4(4)

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ.

Το Gorain είναι μη συνταγογραφούμενο φάρμακο. Να μη χορηγείται σε ασθενείς <18 ετών, πεπτικό έλκος, γαστρεντερική, αγγειοεγκεφαλική ή άλλη αιμορραγία, σοβαρή καρδιακή, ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, αιμοποιητικές διαταραχές, 3ο τρίμηνο κύησης, ασθενείς με γνωστή αντίδραση υπερευαισθησίας στα επιμέρους συστατικά του, ασθενείς που έχουν υποστεί άσθμα ή κνίδωση."

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ιωάννα Παπαλά στα τηλέφωνα 2111 865709 & 697 7672400.

Επισκεφθείτε μας στο www.elpen.gr www.elpen.gr