

# Ipecavom<sup>®</sup> Syrup

## (Ipecacuanha liquid extract)

### 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1 Ipecavom<sup>®</sup> Σιρόπι 1000 mg/15ml.

#### 1.2 Σύνθεση

Δραστική ουσία: Ipecacuanha liquid extract.

Έκδοχα: Ipecavom<sup>®</sup> σιρόπι 1000mg/15ml: Glycerol, sucrose, methylparaben E218, propylparaben E216, carmellose sodium, water.

#### 1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή

Σιρόπι.

#### 1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία

Ipecavom<sup>®</sup> σιρόπι 1000mg/15ml: Κάθε 15ml σιροπιού περιέχουν 1000mg Ipecacuanha liquid extract.

#### 1.5 Περιγραφή - Συσκευασία

Ipecavom<sup>®</sup> σιρόπι 1000mg/15ml: Δύο φιαλίδια των 15ml συσκευάζονται σε χάρτινο κουτί.

#### 1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία

Αντίδοτο για την αντιμετώπιση δηλητηριάσεων.

#### 1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας

Ελλάδα: ELPEN A.E. Φαρμακευτική Βιομηχανία, Λεωφ. Μαραθώνος 95, 19009 Πικέρμι Αττικής.

Κύπρος: Κ.ΤΣΙΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ, Τ.Θ. 56495, Λεμεσός.

#### 1.8 Παρασκευαστής

ELPEN A.E. Φαρμακευτική Βιομηχανία, Λεωφ. Μαραθώνος 95, 19009 Πικέρμι Αττικής

### 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

#### 2.1 Γενικές πληροφορίες

Το Ipecavom<sup>®</sup> είναι ένα ειδικό σιρόπι που περιέχει ως δραστικό συστατικό Ipecacuanha liquid extract και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ανάγκης π.χ. σε δηλητηριάσεις για να προκληθεί έμετος.

#### 2.2 Ενδείξεις

Πρόκληση εμέτου σε δηλητηριάσεις από του στόματος.

#### 2.3 Αντενδείξεις

Η χορήγηση του Ipecavom<sup>®</sup> αντενδείκνυται σε περιπτώσεις που ο ασθενής βρίσκεται σε κώμα. Επίσης αντενδείκνυται όταν έχουν καταποθεί ουσίες που προκαλούν σπασμούς π.χ. στρυχνίνη, ή ουσίες διαβρωτικές (αλκάλια, ισχυρά οξέα), ή προϊόντα αποστάξεως πετρελαίου (βενζίνη, κηροζίνη, πετρέλαιο), λιθανθρακελαίου, διαλυτικών χρωμάτων και καθαριστικών υγρών.

#### 2.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Να μην χορηγείται συγχρόνως με ενεργό άνθρακα ή άλλες προσροφητικές ουσίες.

#### 2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες

Καμμία γνωστή.

#### 2.6 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

α. Παιδιά 6-12 μηνών: Η συνήθης θεραπευτική δόση είναι 5-10ml (1/3 - 2/3 του φιαλιδίου).

β. Παιδιά μεγαλύτερα των 12 μηνών: Η συνήθης θεραπευτική δόση είναι 15ml, δηλαδή ένα φιαλίδιο.

γ. *Ενήλικες*: Η συνήθης θεραπευτική δόση είναι 30ml, δηλαδή 2 φιαλίδια σε εφάπαξ χορήγηση. Μετά τη λήψη του Ipecanov<sup>®</sup> χορηγούνται 100-200ml νερό. Αν δεν προκληθεί έμετος σε 20-25 λεπτά, η δόση επαναλαμβάνεται. Αν σε 20 λεπτά μετά την δεύτερη δόση δεν προκληθεί έμετος, θα πρέπει να ακολουθήσει πλύση στομάχου για την αποφυγή συστηματικών τοξικών εκδηλώσεων.

## 2.7 Υπερδοσολογία

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

## 2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Δεν περιγράφονται στην προτεινόμενη δοσολογία.

## 2.9 Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε κάποια δόση

Δεν εφαρμόζεται.

## 2.10 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος

Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία. Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

## 2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 25°C.

## 2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών: 7-5-2008.

### 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

- Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί τον γιατρό σας.
- Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα, μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
- Να μη διατηρείτε τα φάρμακα στο λουτρό, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
- Διατηρήστε τα φάρμακα στον αρχικό περιέκτη τους.
- Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατήστε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

### 4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το Ipecanov<sup>®</sup> χορηγείται με ιατρική συνταγή.



ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 95, 19009 ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΗΛ.: (210) 6039326-9, FAX: (210) 6039300  
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:  
ΑΘΗΝΑ: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 11, 11528 ΤΗΛ.: (210) 7488711  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΦΟΙΝΙΚΑΣ,  
ΤΗΛ. (2310)-459920-1