

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Rispelen® 1, 2, 3, 4 και 6 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ρισπεριδόνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το Rispelen® και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Rispelen®
3. Πώς να πάρετε το Rispelen®
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Rispelen®
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Rispelen® και ποια είναι η χρήση του

Το Rispelen® ανήκει σε μία κατηγορία φαρμάκων που λέγονται «αντιψυχωσικά». Το Rispelen® χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των παρακάτω:

- Της σχιζοφρένειας, όπου μπορεί να βλέπετε, να ακούτε ή να αισθάνεστε πράγματα που δεν υπάρχουν, να πιστεύετε πράγματα που δεν είναι αλήθεια ή να αισθάνεστε ασυνήθιστα καχύποπτοι ή μπερδεμένοι.
- Της μανίας, όπου μπορεί να αισθάνεστε πολύ ενθουσιασμό, χαρά, διέγερση, ενθουσιασμό ή υπερδραστηριότητα. Η μανία εμφανίζεται σε μία ασθένεια που λέγεται «διπολική διαταραχή».
- Για τη βραχυπρόθεσμη θεραπεία (έως 6 εβδομάδες) της μακροχρόνιας επιθετικότητας σε ανθρώπους με άνοια τύπου Alzheimer, οι οποίοι προκαλούν βλάβη στον εαυτό τους ή σε άλλους. Πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως εναλλακτικές (μη φαρμακευτικές) θεραπείες.
- Για τη βραχυπρόθεσμη θεραπεία (έως 6 εβδομάδες) της μακροχρόνιας επιθετικότητας σε παιδιά με νοητική αναπηρία (ηλικίας τουλάχιστον 5 ετών) και εφήβους με διαταραχή διαγωγής.

Το Rispelen® μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της ασθένειάς σας και να εμποδίσει τα συμπτώματά σας να εμφανιστούν ξανά.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Rispelen®

Μην πάρετε το Rispelen®

- Σε περίπτωση αλλεργίας στη ρισπεριδόνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

Εάν δεν είστε σίγουροι εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, μιλήστε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Rispelen®.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Rispelen® εάν:

- Έχετε πρόβλημα με την καρδιά σας. Παραδείγματα περιλαμβάνουν ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό ή εάν έχετε προδιάθεση για χαμηλή αρτηριακή πίεση ή εάν χρησιμοποιείτε φάρμακα για την αρτηριακή σας πίεση. Το Rispelen® μπορεί να προκαλέσει χαμηλή αρτηριακή πίεση. Μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή της δόσης σας.

- Γνωρίζετε τυχόν παράγοντες που θα ευνοούσαν να πάθετε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιαγγειακή διαταραχή ή προβλήματα των αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλο.
- Έχετε παρουσιάσει ποτέ μη ηθελημένες κινήσεις της γλώσσας, του στόματος και του προσώπου.
- Είχατε ποτέ μία κατάσταση της οποίας τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλή θερμοκρασία, μυϊκή δυσκαμψία, εφίδρωση ή μειωμένο επίπεδο συνείδησης (γνωστό επίσης ως Κακώθης Νευροληπτικό Σύνδρομο).
- Έχετε νόσο του Πάρκινσον ή άνοια.
- Γνωρίζετε ότι στο παρελθόν είχατε χαμηλά επίπεδα λευκοκυττάρων (το οποίο μπορεί να προκλήθηκε ή να μην προκλήθηκε από άλλα φάρμακα).
- Είστε διαβητικός.
- Έχετε επιληψία.
- Είστε άνδρας και είχατε ποτέ παρατεταμένη ή επώδυνη στύση.
- Έχετε προβλήματα ελέγχου της θερμοκρασίας του σώματός σας ή υπερθερμία.
- Έχετε νεφρικά προβλήματα.
- Έχετε ηπατικά προβλήματα.
- Έχετε αφύσικα υψηλά επίπεδα της ορμόνης προλακτίνης στο αίμα σας ή έχετε έναν όγκο που πιθανώς σχετίζεται με την προλακτίνη.
- Εσείς ή κάποιος άλλος στην οικογένειά σας έχει ιστορικό θρόμβων στο αίμα, καθώς τα αντιψυχωσικά έχουν συνδεθεί με τη δημιουργία θρόμβων στο αίμα.

Εάν δεν είστε σίγουροι εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, μιλήστε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Rispelen®.

Καθώς έχουν παρατηρηθεί πολύ σπάνια σε ασθενείς που λαμβάνουν Rispelen® επικίνδυνα χαμηλοί αριθμοί ενός συγκεκριμένου τύπου λευκοκυττάρων που χρειάζονται για να καταπολεμήσουν τις λοιμώξεις στο αίμα σας, ο γιατρός σας μπορεί να ελέγχει τον αριθμό των λευκοκυττάρων σας.

Το Rispelen® μπορεί να σας προκαλέσει αύξηση του σωματικού βάρους. Η σημαντική αύξηση του σωματικού βάρους μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία σας. Ο γιατρός σας πρέπει να μετρά τακτικά το σωματικό σας βάρος.

Καθώς έχει παρατηρηθεί σακχαρώδης διαβήτης ή επιδείνωση προϋπάρχοντος σακχαρώδους διαβήτη σε ασθενείς που λαμβάνουν Rispelen®, ο γιατρός σας πρέπει να ελέγχει για σημεία υψηλού σακχάρου στο αίμα. Σε ασθενείς με προϋπάρχοντα σακχαρώδη διαβήτη, πρέπει να παρακολουθείται τακτικά η γλυκόζη στο αίμα.

Το Rispelen® συνήθως αυξάνει τα επίπεδα μιας ορμόνης που ονομάζεται «προλακτίνη». Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως διαταραχές της εμμήνου ρύσης ή προβλήματα γονιμότητας στις γυναίκες, διόγκωση του μαστού στους άνδρες (βλ. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες). Εάν εμφανιστούν τέτοιες ανεπιθύμητες ενέργειες, συνιστάται η αξιολόγηση του επιπέδου της προλακτίνης στο αίμα.

Κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στο μάτι για την αντιμετώπιση της θόλωσης του φακού (καταρράκτης), η κόρη (ο μαύρος δίσκος που βρίσκεται στο μέσον του ματιού σας) μπορεί να μην αυξηθεί σε μέγεθος όσο χρειάζεται. Επίσης, η ίριδα (το χρωματιστό τμήμα του ματιού) μπορεί να χαλαρώσει κατά τη διάρκεια της επέμβασης και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη στο μάτι. Εάν προγραμματίζετε να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση στο μάτι, ενημερώστε τον οφθαλμίατρό σας ότι λαμβάνετε αυτό το φάρμακο.

Ηλικιωμένοι ασθενείς με άνοια

Σε ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Δεν πρέπει να πάρετε ρισπεριδόνη αν έχετε άνοια που έχει προκληθεί από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ρισπεριδόνη, πρέπει να επισκέπτεστε συχνά τον γιατρό σας.

Πρέπει να αναζητηθεί αμέσως ιατρική θεραπεία εάν εσείς ή ο φροντιστής σας παρατηρήσετε μία ξαφνική μεταβολή της ψυχικής σας κατάστασης ή ξαφνική αδυναμία ή μούδιασμα στο πρόσωπο, στα χέρια ή στα πόδια σας, ιδιαίτερα στη μία πλευρά, ή κακή άρθρωση λόγου, ακόμα και για σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτά μπορεί να είναι σημεία αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Παιδιά και έφηβοι

Πριν ξεκινήσει θεραπεία για τη διαταραχή διαγωγής, πρέπει να έχουν αποκλειστεί άλλες αιτίες για την επιθετική συμπεριφορά.

Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ρισπεριδόνη εμφανιστεί κούραση, η αλλαγή της ώρας χορήγησης μπορεί να βελτιώσει τις δυσκολίες στην προσοχή.

Πριν από την έναρξη της θεραπείας, μπορεί να γίνεται μέτρηση του σωματικού σας βάρους ή του σωματικού βάρους του παιδιού σας και μπορεί να παρακολουθείται τακτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Μια μικρή και με ασαφή συμπεράσματα μελέτη ανέφερε αύξηση του ύψους σε παιδιά που έλαβαν ρισπεριδόνη, αλλά δεν είναι γνωστό εάν αυτό αποτελεί επίδραση του φαρμάκου ή οφείλεται σε κάποιον άλλο λόγο.

Άλλα φάρμακα και Rispelen®

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μιλήσετε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα

- Φάρμακα που δρουν στον εγκέφαλό σας, όπως για να σας βοηθήσουν να ηρεμήσετε (βενζοδιαζεπίνες) ή μερικά φάρμακα για τον πόνο (οπιούχα), φάρμακα για την αλλεργία (ορισμένα αντισταμινικά), καθώς η ρισπεριδόνη μπορεί να αυξήσει την κατασταλτική δράση όλων αυτών.
- Φάρμακα που μπορεί να μεταβάλλουν την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς σας, όπως φάρμακα για την ελονοσία, για προβλήματα του καρδιακού ρυθμού, για αλλεργίες (αντισταμινικά), μερικά αντικαταθλιπτικά ή άλλα φάρμακα για ψυχικά προβλήματα.
- Φάρμακα που μειώνουν τον καρδιακό παλμό.
- Φάρμακα που μειώνουν το κάλιο στο αίμα (όπως ορισμένα διουρητικά).
- Φάρμακα για τη θεραπεία της αυξημένης αρτηριακής πίεσης. Το Rispelen® μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση.
- Φάρμακα για τη νόσο του Πάρκινσον (όπως η λεβοντόπα).
- Φάρμακα που αυξάνουν τη δραστηριότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος (ψυχοδιεγερτικά, όπως η μεθυλφαινιδάτη).
- Διουρητικά που χρησιμοποιούνται για προβλήματα με την καρδιά ή για διογκωμένα μέρη του σώματός σας εξαιτίας κατακράτησης πολύ μεγάλης ποσότητας υγρού (όπως η φουροσεμίδα ή η χλωροθειαζίδη). Το Rispelen® όταν λαμβάνεται μόνο του ή σε συνδυασμό με φουροσεμίδα, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή θάνατο σε ηλικιωμένα άτομα με άνοια.

Τα παρακάτω φάρμακα μπορεί να μειώσουν την επίδραση της ρισπεριδόνης

- Ριφαμπικίνη (φάρμακο για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων).
- Καρβαμαζεπίνη, φαινυτοΐνη (φάρμακα για την επιληψία).
- Φαινοβαρβιτάλη.

Εάν ξεκινήσετε ή σταματήσετε να παίρνετε τέτοια φάρμακα, μπορεί να χρειαστείτε διαφορετική δόση ρισπεριδόνης.

Τα παρακάτω φάρμακα μπορεί να αυξήσουν την επίδραση της ρισπεριδόνης

- Κινιδίνη (χρησιμοποιείται για ορισμένα είδη καρδιακής νόσου).
- Αντικαταθλιπτικά, όπως παροξετίνη, φλουοξετίνη, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά.
- Φάρμακα που είναι γνωστά ως βήτα-αποκλειστές (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης).
- Φαινοθειαζίνες (όπως τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της ψύχωσης ή για να επιφέρουν ηρεμία).
- Σιμετιδίνη, ρανιτιδίνη (αποκλειστές της οξύτητας του στομάχου).
- Ιτρακοναζόλη και κετοκοναζόλη (φάρμακα για τη θεραπεία των μυκητιασικών λοιμώξεων).
- Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του HIV/AIDS, όπως η ριτοναβίρη.
- Βεραπαμίλη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης και/ή του μη φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού.
- Σεραλίνη και φλουβοξαμίνη, φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης και άλλων ψυχιατρικών διαταραχών.

Εάν ξεκινήσετε ή σταματήσετε να παίρνετε τέτοια φάρμακα, μπορεί να χρειαστείτε διαφορετική δόση

ρισπεριδόνης.

Εάν δεν είστε σίγουροι εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, μιλήστε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Rispelen®.

Το Rispelen® με τροφή, ποτό και οιοπνευματώδη

Μπορείτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο με ή χωρίς τροφή. Πρέπει να αποφεύγετε να πίνετε οιοπνευματώδη όταν παίρνετε το Rispelen®.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

- Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. Ο γιατρός σας θα αποφασίζει εάν μπορείτε να το πάρετε.
- Τα ακόλουθα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν σε νεογνήνητα βρέφη μητέρων που έχουν χρησιμοποιήσει το Rispelen® το τελευταίο τρίμηνο (τους τελευταίους τρεις μήνες της κύησής τους): τρέμουλο, μυϊκή δυσκαμψία και/ή αδυναμία, υπνηλία, διέγερση, αναπνευστικά προβλήματα και δυσκολία στη σίτιση. Εάν το μωρό σας εμφανίσει οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας.
- Το Rispelen® μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα μίας ορμόνης σας που ονομάζεται «προλακτίνη», η οποία μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα (βλ. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες).

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Κατά τη διάρκεια θεραπείας με Rispelen® μπορεί να εμφανιστούν ζάλη, κούραση και προβλήματα όρασης. Μην οδηγείτε ή χειρίζεστε οποιαδήποτε εργαλεία ή μηχανήματα χωρίς να μιλήσετε πρώτα με τον γιατρό σας.

Το Rispelen® περιέχει λακτόζη

Αν ο γιατρός σας, σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.

Το Rispelen® περιέχει νάτριο

Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δισκίο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».

Το Rispelen® περιέχει προπυλενογλυκόλη (E1520)

Αυτό το φάρμακο περιέχει 0,8 mg προπυλενογλυκόλης σε κάθε δισκίο των 6 mg.

3. Πώς να πάρετε το Rispelen®

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνιστώμενη δόση είναι η ακόλουθη:

Για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας

Ενήλικες

- Η συνηθισμένη δόση έναρξης είναι 2 mg ανά ημέρα, αυτή μπορεί να αυξηθεί στα 4 mg ανά ημέρα τη δεύτερη ημέρα.
- Η δόση σας μπορεί στη συνέχεια να προσαρμοστεί από τον γιατρό σας, ανάλογα με το πώς ανταποκρίνεστε στη θεραπεία.
- Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται καλύτερα με ημερήσιες δόσεις από 4 έως 6 mg.
- Αυτή η συνολική ημερήσια δόση μπορεί να διαιρεθεί είτε σε μία είτε σε δύο δόσεις την ημέρα. Ο γιατρός σας θα σας πει ποια είναι η καλύτερη για εσάς.

Ηλικιωμένα άτομα

- Η δόση έναρξης θα είναι κανονικά 0,5 mg δύο φορές την ημέρα.
- Η δόση σας μπορεί στη συνέχεια να αυξηθεί σταδιακά από τον γιατρό σας στα 1 mg έως 2 mg δύο φορές την ημέρα.
- Ο γιατρός σας θα σας πει τι είναι καλύτερο για εσάς.

Για τη θεραπεία της μανίας

Ενήλικες

- Η δόση έναρξης θα είναι συνήθως 2 mg μία φορά την ημέρα.
- Η δόση σας μπορεί στη συνέχεια να προσαρμοστεί σταδιακά από τον γιατρό σας, ανάλογα με το πώς ανταποκρίνεστε στη θεραπεία.
- Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται καλύτερα με δόσεις από 2 έως 6 mg μία φορά την ημέρα.

Ηλικιωμένα άτομα

- Η δόση έναρξης θα είναι συνήθως 0,5 mg δύο φορές την ημέρα.
- Η δόση σας μπορεί στη συνέχεια να προσαρμοστεί σταδιακά από τον γιατρό σας στα 1 mg έως 2 mg δύο φορές την ημέρα, ανάλογα με το πώς ανταποκρίνεστε στη θεραπεία.

Για τη θεραπεία της επίμονης επιθετικότητας σε άτομα με άνοια τύπου Alzheimer

Ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων)

- Η δόση έναρξης θα είναι κανονικά 0,25 mg (0,25 ml Rispelen® πόσιμο διάλυμα 1 mg/ml) δύο φορές την ημέρα.
- Η δόση σας μπορεί στη συνέχεια να προσαρμοστεί σταδιακά από τον γιατρό σας, ανάλογα με το πώς ανταποκρίνεστε στη θεραπεία.
- Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται καλύτερα με 0,5 mg δύο φορές την ημέρα. Μερικοί ασθενείς μπορεί να χρειαστούν 1 mg δύο φορές την ημέρα.
- Η διάρκεια της θεραπείας σε ασθενείς με άνοια τύπου Alzheimer δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 6 εβδομάδες.

Χρήση σε παιδιά και εφήβους

- Τα παιδιά και οι έφηβοι κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία με Rispelen® για σχιζοφρένεια ή μανία.

Για τη θεραπεία της διαταραχής διαγωγής

Η δόση θα εξαρτηθεί από το βάρος του παιδιού σας:

Για παιδιά με βάρος μικρότερο των 50 kg

- Η δόση έναρξης θα είναι κανονικά 0,25 mg (0,25 ml Rispelen® πόσιμο διάλυμα 1 mg/ml) μία φορά την ημέρα.
- Η δόση μπορεί να αυξηθεί κάθε δεύτερη ημέρα κατά 0,25 mg ανά ημέρα.
- Η συνηθισμένη δόση συντήρησης είναι 0,25 mg έως 0,75 mg (0,25 ml έως 0,75 ml Rispelen® πόσιμο διάλυμα 1 mg/ml) μία φορά την ημέρα.

Για παιδιά με βάρος 50 kg ή μεγαλύτερο

- Η δόση έναρξης θα είναι κανονικά 0,5 mg μία φορά την ημέρα.
- Η δόση μπορεί να αυξηθεί κάθε δεύτερη ημέρα κατά 0,5 mg ανά ημέρα.
- Η συνηθισμένη δόση συντήρησης είναι 0,5 mg έως 1,5 mg μία φορά την ημέρα.

Η διάρκεια της θεραπείας σε ασθενείς με διαταραχή διαγωγής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 6 εβδομάδες.

Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών δεν πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία με Rispelen® για τη διαταραχή διαγωγής.

Άτομα με νεφρικά ή ηπατικά προβλήματα

Ανεξάρτητα από την υπό θεραπεία νόσο, όλες οι δόσεις έναρξης και οι επακόλουθες δόσεις ρισπεριδόνης πρέπει να μειώνονται στο μισό. Οι αυξήσεις στις δόσεις πρέπει να γίνονται πιο αργά στους ασθενείς αυτούς.

Η ρισπεριδόνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτή την ομάδα ασθενών.

Τρόπος χορήγησης

Από στόματος χρήση

- Πρέπει να καταπίνετε το δισκίο σας με νερό.
- Η εγκοπή υπάρχει μόνο για να σας βοηθήσει στη θραύση του δισκίου σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να το καταπιείτε ολόκληρο.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Rispelen® από την κανονική

- Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Πάρτε μαζί σας τη συσκευασία του φαρμάκου.
- Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, μπορεί να αισθανθείτε υπνηλία ή κούραση ή να έχετε μη φυσιολογικές κινήσεις σώματος, προβλήματα να στέκεστε και να περπατάτε, να αισθάνεστε ζάλη λόγω χαμηλής αρτηριακής πίεσης ή να έχετε μη φυσιολογικούς καρδιακούς παλμούς ή κρίσεις.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Rispelen®

- Εάν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση, να την πάρετε αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Παρόλα αυτά, αν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση σας, παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε και συνεχίστε όπως συνήθως. Εάν παραλείψετε δύο ή περισσότερες δόσεις, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.
- **Μην πάρετε διπλή δόση (δύο δόσεις την ίδια στιγμή) για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.**

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Rispelen®

Δεν πρέπει να σταματήσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, εκτός και αν σας το πει ο γιατρός σας. Τα συμπτώματά σας μπορεί να επανέλθουν. Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει να σταματήσει αυτό το φάρμακο, η δόση σας μπορεί να μειωθεί σταδιακά σε διάστημα μερικών ημερών.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Ενημερώστε τον γιατρό σας αμέσως εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα):

- Έχετε άνοια και παρουσιάσετε ξαφνική αλλαγή στην ψυχική σας κατάσταση ή ξαφνική αδυναμία ή μούδιασμα στο πρόσωπο, τα χέρια ή τα πόδια σας, ιδίως στη μία πλευρά, ή κακή άρθρωση λόγου, ακόμα και για σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτά μπορεί να είναι σημεία αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.
- Παρουσιάσετε όπιμη δυσκινησία (τινάγματα ή σπασμωδικές κινήσεις που δεν μπορείτε να ελέγξετε στο πρόσωπο, τη γλώσσα ή σε άλλα μέρη του σώματός σας). Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας εάν παρουσιάσετε μη ηθελημένες ρυθμικές κινήσεις της γλώσσας, του στόματος και του προσώπου. Μπορεί να χρειαστεί η διακοπή του Rispelen®.

Ενημερώστε τον γιατρό σας αμέσως εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα):

- Παρουσιάσετε θρόμβους αίματος στις φλέβες, ιδίως στα πόδια (τα συμπτώματα περιλαμβάνουν διόγκωση, πόνο και ερυθρότητα στο πόδι), οι οποίοι μπορεί να μετακινηθούν μέσω των αιμοφόρων αγγείων στους πνεύμονες, προκαλώντας πόνο στο στήθος και δυσκολία στην αναπνοή. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- Παρουσιάσετε πυρετό, μυϊκή δυσκαμψία, εφίδρωση ή μειωμένο επίπεδο συνείδησης (μία διαταραχή που λέγεται «Κακόηθες Νευροληπτικό Σύνδρομο»). Μπορεί να χρειαστεί άμεση ιατρική θεραπεία.
- Είστε άνδρας και παρουσιάσετε παρατεταμένη ή επώδυνη στύση. Αυτό ονομάζεται πριαπισμός. Μπορεί να χρειαστεί άμεση ιατρική θεραπεία.
- Παρουσιάσετε σοβαρή αλλεργική αντίδραση που χαρακτηρίζεται από πυρετό, πρησμένο στόμα, πρόσωπο, χείλος ή γλώσσα, δύσπνοια, φαγούρα, δερματικό εξάνθημα ή πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Επίσης, μπορεί να εμφανιστούν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες:

Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα):

- Δυσκολία να κοιμηθείτε ή να παραμείνετε κοιμισμένοι.

- Παρκινσονισμός: Η κατάσταση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει: αργή ή μειωμένη κίνηση, αίσθηση δυσκαμψίας ή σφιξίματος των μυών (που κάνει τις κινήσεις σας σαν τινάγματα), και μερικές φορές και την αίσθηση ότι «παγώνει» η κίνηση και μετά αρχίζει ξανά. Άλλα σημεία παρκινσονισμού περιλαμβάνουν αργό, συρτό περπάτημα, τρόμο κατά την ανάπαυση, αυξημένο σάλιο και/ή ακούσια ροή σιέλου από το στόμα, και απώλεια της έκφρασης του προσώπου.
- Αίσθηση υπνηλίας ή μειωμένης εγρήγορσης.
- Κεφαλαλγία.

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα):

- Πνευμονία, λοίμωξη του θώρακα (βρογχίτιδα), συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, λοίμωξη των ιγμορίων, λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος, λοίμωξη του ωτός, αίσθηση ότι έχετε γρίπη.
- Αυξημένα επίπεδα μίας ορμόνης που ονομάζεται «προλακτίνη» και βρίσκονται με εξέταση αίματος (το οποίο μπορεί να προκαλέσει ή να μην προκαλέσει συμπτώματα). Τα συμπτώματα της υψηλής προλακτίνης δεν εμφανίζονται συχνά και μπορεί να περιλαμβάνουν στους άνδρες διόγκωση των μαστών, δυσκολία στην επίτευξη ή τη διατήρηση στύσης, μειωμένη σεξουαλική επιθυμία ή άλλη σεξουαλική δυσλειτουργία. Στις γυναίκες, μπορεί να περιλαμβάνουν δυσανεξία μαστού, διαρροή γάλακτος από τους μαστούς, απώλεια εμμήνων ρύσεων ή άλλα προβλήματα με τον κύκλο σας ή προβλήματα γονιμότητας.
- Αύξηση βάρους, αυξημένη όρεξη, μειωμένη όρεξη.
- Διαταραχή ύπνου, ευερεθιστότητα, κατάθλιψη, άγχος, ανησυχία.
- Δυστονία: Αυτή είναι μία κατάσταση που περιλαμβάνει αργές ή παρατεταμένες μη ηθελημένες συσπάσεις των μυών. Ενώ μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος (και μπορεί να οδηγήσει σε μη φυσιολογική στάση του σώματος), η δυστονία συχνά αφορά στους μύες του προσώπου, συμπεριλαμβανομένων μη φυσιολογικών κινήσεων των οφθαλμών, του στόματος, της γλώσσας ή της γνάθου.
- Ζάλη.
- Δυσκινησία: Αυτή είναι μία κατάσταση που περιλαμβάνει μη ηθελημένες μυϊκές κινήσεις και μπορεί να περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες, σπαστικές ή συστροφικές κινήσεις ή συσπάσεις.
- Τρόμος (τρέμουλο).
- Θάμβος οράσεως, λοίμωξη οφθαλμού ή «επιτεφυκίτιδα».
- Γρήγορος καρδιακός ρυθμός, υψηλή αρτηριακή πίεση, δύσπνοια.
- Πονόλαιμος, βήχας, ρινορραγία, βουλωμένη μύτη.
- Κοιλιακό άλγος, κοιλιακή δυσφορία, έμετος, ναυτία, δυσκοιλιότητα, διάρροια, δυσπεψία, ξηροστομία, πονόδοντος.
- Εξάνθημα, ερυθρότητα δέρματος.
- Μυϊκοί σπασμοί, πόνος των οστών ή των μυών, οσφυαλγία, πόνος των αρθρώσεων.
- Ακράτεια (έλλειψη ελέγχου) των ούρων.
- Οίδημα του σώματος, των χεριών ή των ποδιών, πυρετός, θωρακικό άλγος, αδυναμία, κόπωση (κούραση), πόνος.
- Πτώση.

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα):

- Λοίμωξη των αναπνευστικών οδών, λοίμωξη της ουροδόχου κύστης, λοίμωξη του οφθαλμού, αμυγδαλίτιδα, μυκητίαση των νυχιών, λοίμωξη του δέρματος, λοίμωξη που περιορίζεται σε μία μόνο περιοχή του δέρματος ή μέρος του σώματος, ιογενής λοίμωξη, φλεγμονή του δέρματος προκαλούμενη από ακάρεα.
- Μείωση στον τύπο λευκοκυττάρων που σας προστατεύουν από τις λοιμώξεις, μειωμένος αριθμός λευκοκυττάρων, μείωση των αιμοπεταλίων (κύτταρα του αίματος που βοηθούν να σταματήσουν οι αιμορραγίες), αναιμία, μείωση των ερυθροκυττάρων, αύξηση των ηωσινοφίλων (τύπος λευκοκυττάρων) στο αίμα σας.
- Αλλεργική αντίδραση.
- Διαβήτης ή επιδείνωση διαβήτη, υψηλό σάκχαρο στο αίμα, υπερβολική κατανάλωση νερού.
- Απώλεια βάρους, απώλεια της όρεξης με αποτέλεσμα υποσιτισμό και χαμηλό σωματικό βάρος.
- Αυξημένη χοληστερόλη στο αίμα σας.
- Ευφορική διάθεση (μανία), σύγχυση, μειωμένη γενετήσια ορμή, νευρικότητα, εφιάλτες.
- Απουσία ανταπόκρισης σε ερεθίσματα, απώλεια συνείδησης, χαμηλό επίπεδο συνείδησης.
- Σπασμός (κρίσεις), λιποθυμία.

- Μία ακατανίκητη επιθυμία να κινείτε μέρη του σώματός σας, διαταραχή της ισορροπίας, μη φυσιολογικός συντονισμός, ζάλη ενώ στέκεστε, διαταραχή στην προσοχή, προβλήματα με την ομιλία, απώλεια ή μη φυσιολογική αίσθηση της γεύσης, μειωμένη αίσθηση του δέρματος στον πόνο και στο άγγιγμα, αίσθηση μυρμηκίασης, τσιμπήματος ή μουδιάσματος στο δέρμα.
- Υπερευαισθησία των ματιών στο φως, ξηροφθαλμία, αυξημένα δάκρυα, ερυθρότητα των ματιών.
- Αίσθηση περιστροφής (ίλιγγος), κουδούνισμα στα αυτιά, πόνος στα αυτιά.
- Κολπική μαρμαρυγή (μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός), διακοπή στην αγωγιμότητα μεταξύ ανώτερων και κατώτερων τμημάτων της καρδιάς, μη φυσιολογική ηλεκτρική αγωγιμότητα της καρδιάς, παρατεταμένο διάστημα QT της καρδιάς σας, αργός καρδιακός ρυθμός, μη φυσιολογική καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς (ηλεκτροκαρδιογράφημα ή ΗΚΓ), πτερυγισμός ή αίσθημα δυνατών κτύπων στο στήθος σας (αίσθημα παλμών).
- Χαμηλή αρτηριακή πίεση, χαμηλή αρτηριακή πίεση ενώ στέκεστε (συνεπώς, ορισμένα άτομα που λαμβάνουν το Rispelen® μπορεί να έχουν τάσεις λιποθυμίας, ζάλη ή μπορεί να λιποθυμήσουν όταν σηκώνονται ή κάθονται απότομα), ερυθρίαση.
- Πνευμονία που προκαλείται από την εισρόφιση τροφής, πνευμονική συμφόρηση, συμφόρηση των αναπνευστικών οδών, πνευμονικοί τριγμώνδες ήχοι, συριγμός, διαταραχή της φωνής, διαταραχή της αναπνευστικής οδού.
- Λοίμωξη του στομάχου ή του εντέρου, ακράτεια κοπράνων, πολύ σκληρά κόπρανα, δυσκολία στην κατάποση, υπερβολικά αέρια ή τυμπανισμός.
- Κνίδωση (ή «κνιδωτικό εξάνθημα»), φαγούρα, απώλεια μαλλιών, πάχυνση του δέρματος, έκζεμα, ξηροδερμία, αποχρωματισμός δέρματος, ακμή, λεπιοειδής όψη του τριχωτού της κεφαλής ή του δέρματος με κνησμό, διαταραχή δέρματος, δερματική βλάβη.
- Αύξηση της CPK (κρεατινοφωσφοκινάση) στο αίμα σας, ένα ένζυμο που απελευθερώνεται ορισμένες φορές κατά τη διάσπαση των μυών.
- Μη φυσιολογική στάση σώματος, δυσκαμψία άρθρωσης, διόγκωση άρθρωσης, μυϊκή αδυναμία, πόνος στον αυχένα.
- Συχνουουρία, ανικανότητα ούρησης, πόνος κατά την ούρηση.
- Στυτική δυσλειτουργία, διαταραχή εκσπερμάτισης.
- Απώλεια εμμήνων ρύσεων, απώλεια αριθμού εμμήνων ρύσεων ή άλλα προβλήματα με τον κύκλο σας (γυναίκες).
- Ανάπτυξη μαστών στους άνδρες, διαρροή γάλακτος από τους μαστούς, σεξουαλική δυσλειτουργία, πόνος στους μαστούς, δυσανεξία μαστού, κολπικό έκκριμα.
- Οίδημα του προσώπου, του στόματος, των ματιών ή των χειλιών.
- Ρίγη, αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος.
- Αλλαγή στον τρόπο που περπατάτε.
- Αίσθημα δίψας, αίσθημα αδιαθεσίας, δυσφορία στον θώρακα, αίσθημα ότι «δεν είστε ο εαυτός σας», δυσφορία.
- Αυξημένες ηπατικές τρανσαμινάσες στο αίμα σας, αυξημένη GGT (ένα ηπατικό ένζυμο που ονομάζεται γ-γλουταμυλτρανσφεράση) στο αίμα σας, αυξημένα ηπατικά ένζυμα στο αίμα σας.
- Άλγος κατά την επέμβαση.

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα):

- Λοίμωξη.
- Απρόσφορη έκκριση μίας ορμόνης που ελέγχει τον όγκο των ούρων.
- Υποβοασία.
- Σχετιζόμενη με τον ύπνο διαταραχή στη λήψη τροφής.
- Σάκχαρο στα ούρα, χαμηλό σάκχαρο αίματος, υψηλά τριγλυκερίδια αίματος (ένα λιπίδιο).
- Έλλειψη συναισθήματος, ανικανότητα επίτευξης οργασμού.
- Απουσία κίνησης ή ανταπόκρισης ενόσω είστε ξύπνιοι (κατατονία).
- Προβλήματα με τα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου.
- Κώμα εξαιτίας μη ελεγχόμενου διαβήτη.
- Τρέμουλο της κεφαλής.
- Γλαύκωμα (αυξημένη πίεση εντός του βολβού του ματιού), προβλήματα με την κίνηση των ματιών σας, συστροφή του οφθαλμικού βολβού, εφελκίδα στο χείλος του βλεφάρου.
- Οφθαλμολογικά προβλήματα κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης καταρράκτη. Κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης καταρράκτη, μπορεί να παρουσιαστεί μία κατάσταση που ονομάζεται διεγχειρητικό σύνδρομο χαλαρής ίριδας (IFIS) εάν λαμβάνετε ή έχετε λάβει το Rispelen®.

Εάν χρειάζεται να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση καταρράκτη, φροντίστε να ενημερώσετε τον οφθαλμίατρό σας εάν λαμβάνετε ή έχετε λάβει το φάρμακο αυτό.

- Επικίνδυνα χαμηλοί αριθμοί ενός συγκεκριμένου τύπου λευκοκυττάρων που απαιτούνται για την καταπολέμηση των λοιμώξεων στο αίμα σας.
- Επικίνδυνα υπερβολική πρόσληψη νερού.
- Ακανόνιστος καρδιακός παλμός.
- Δυσκολία στην αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου (υπνική άπνοια), γρήγορη, ρηχή αναπνοή.
- Φλεγμονή του παγκρέατος, απόφραξη των εντέρων.
- Πρησμένη γλώσσα, σκασμένα χείλη, εξάνθημα στο δέρμα που σχετίζεται με το φάρμακο.
- Πιτυρίδα.
- Διάσπαση των ινών των μυών και πόνος στους μύες (ραβδομυόλυση).
- Καθυστέρηση στις έμμηνες ρύσεις, μεγέθυνση των αδένων στους μαστούς σας, μεγέθυνση των μαστών, έκκριμα από τους μαστούς.
- Αυξημένη ινσουλίνη (μία ορμόνη που ελέγχει τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα) στο αίμα σας.
- Σκλήρυνση του δέρματος.
- Μειωμένη θερμοκρασία σώματος, ψυχρότητα στα χέρια και τα πόδια.
- Συμπτώματα από απόσυρση του φαρμάκου.
- Κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών (ίκτερος).

Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα):

- Απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές μη ελεγχόμενου διαβήτη.
- Σοβαρή αλλεργική αντίδραση με οίδημα που μπορεί να περιλαμβάνει τον λαιμό και να οδηγήσει σε δυσκολία στην αναπνοή.
- Έλλειψη της κίνησης των μυών του εντέρου που προκαλεί απόφραξη.

Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα):

- Σοβαρό ή απειλητικό για τη ζωή εξάνθημα με φλύκταινες και απολέπιση του δέρματος, το οποίο μπορεί να ξεκινήσει μέσα και γύρω από το στόμα, τη μύτη, τα μάτια και τα γεννητικά όργανα και να εξαπλωθεί σε άλλες περιοχές του σώματος (σύνδρομο Stevens-Johnson ή τοξική επιδερμική νεκρόλυση).

Η ακόλουθη ανεπιθύμητη ενέργεια έχει παρατηρηθεί με τη χρήση ενός άλλου φαρμάκου που ονομάζεται παλιπεριδόνη και είναι πολύ παρόμοιο με τη ρισπεριδόνη, οπότε αυτή μπορεί επίσης να αναμένεται με το Rispelen®: Γρήγορος καρδιακός παλμός κατά την ορθοστασία.

Συμπληρωματικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιά και εφήβους

Γενικά, αναμένεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες στα παιδιά θα είναι παρόμοιες με αυτές στους ενήλικες. Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν πιο συχνά σε παιδιά και εφήβους (5 έως 17 ετών) από ό,τι σε ενήλικες: αίσθημα υπνηλίας ή μειωμένης εγρήγορσης, κόπωση (κούραση), κεφαλαλγία, αυξημένη όρεξη, έμετος, συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, ρινική συμφόρηση, κοιλιακό άλγος, ζάλη, βήχας, πυρετός, τρόμος (τρέμουλο), διάρροια και ακράτεια (έλλειψη του ελέγχου) των ούρων.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς να φυλάσσετε το Rispelen®

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην κυψέλη και το κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Rispelen®

- Η δραστική ουσία είναι η ρισπεριδόνη. Κάθε Rispelen® επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg ή 6 mg ρισπεριδόνης.

- Τα άλλα συστατικά είναι:

Πυρήνας δισκίου:

Rispelen® 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Μονοϋδρική λακτόζη, άμυλο αραβοσίτου, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, υπρομελλόζη 2910, στεατικό μαγνήσιο, κολλοειδές άνυδρο πυρίτιο, λαουρυλοθειικό νάτριο.

Rispelen® 6 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Μονοϋδρική λακτόζη, άμυλο αραβοσίτου, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, στεατικό μαγνήσιο, κολλοειδές άνυδρο πυρίτιο, λαουρυλοθειικό νάτριο.

Επικάλυψη λεπτού υμενίου:

Rispelen® 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Υπρομελλόζη 606, διοξείδιο του τιτανίου (E171), μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, στεατική πολυαιθυλενογλυκόλη (40 ΕΟ Τύπου Ι).

Rispelen® 2 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Υπρομελλόζη 2910, στεατική πολυαιθυλενογλυκόλη (40 ΕΟ Τύπου Ι), μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, διοξείδιο του τιτανίου (E171), οξείδιο του σιδήρου κίτρινο (E172), οξείδιο του σιδήρου ερυθρό (E172), κεκαθαρμένος τάλκης.

Rispelen® 3 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Υπρομελλόζη 2910, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, διοξείδιο του τιτανίου (E171), στεατική πολυαιθυλενογλυκόλη (Τύπου Ι), κίτρινο κινολίνης (E104).

Rispelen® 4 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Υπρομελλόζη 2910, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, διοξείδιο του τιτανίου (E171), στεατική πολυαιθυλενογλυκόλη (Τύπου Ι), κίτρινο κινολίνης (E104), κυανό (E132).

Rispelen® 6 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Υπρομελλόζη 2910 5 MPAS, διοξείδιο του τιτανίου (E171), κεκαθαρμένος τάλκης, προπυλενογλυκόλη (E1520).

Εμφάνιση του Rispelen® και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Rispelen® 1 mg είναι λευκά, επιμήκη, αμφίκυρτα με χαραγή στη μία πλευρά.

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Rispelen® 2 mg είναι πορτοκαλί, επιμήκη, αμφίκυρτα με χαραγή στη μία πλευρά.

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Rispelen® 3 mg είναι κίτρινα, επιμήκη με χαραγή στη μία πλευρά.

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Rispelen® 4 mg είναι πράσινα, επιμήκη με χαραγή στη μία πλευρά.

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Rispelen® 6 mg είναι λευκά, στρογγυλά με χαραγή.

Συσκευάζονται σε κυψέλες από PVC/PVDC/αλουμίνιο σε κουτί που περιέχει 20 (2 blisters των 10 δισκίων), 30 (3 blisters των 10 δισκίων) ή 60 (6 blisters των 10 δισκίων) επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 1 mg, 2 mg, 3 mg και 4 mg, ή 28 (4 blisters των 7 δισκίων) επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 6 mg.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

ELPEN ΑΕ Φαρμακευτική Βιομηχανία

Λεωφ. Μαραθώνος 95, 19009 Πικέρμι Αττικής, Ελλάδα

Τηλ.: 210 6039326-9

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο 2024.